

**Рецептурные задания для итоговой государственной аттестации студентов
6 курса педиатрического факультета**

Противомикробные препараты

1. Выпишите рецепт на **Амоксициллин** ребенку 2 лет (13 кг) для лечения острого среднего отита.

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Amoxicillin	Гранулы д/приг. сусп. для приема внутрь 250мг/5мл (флак.) Пор. д/приг. сусп. для приема внутрь 125 мг/5мл, 250мг/5мл, 500 мг/5мл (флак.) Табл. 250 мг, 500 мг Табл. дисперг. 125 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг	45-90 мг/кг/сутки внутрь (максимально — 2 г/сутки) в 2-3 приема. Детям старше 10 лет 0,5-1 г 3 раза в сутки.

- Выпишите рецепт на **Амоксициллин** ребенку 6 лет (24 кг) для лечения острого тонзиллита.

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Amoxicillin	Гранулы д/приг. сусп. для приема внутрь 250мг/5мл (флак.) Пор. д/приг. сусп. для приема внутрь 125 мг/5мл, 250мг/5мл, 500 мг/5мл (флак.) Табл. 250 мг, 500 мг Табл. дисперг. 125 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг	45-90 мг/кг/сутки внутрь (максимально — 2 г/сутки) в 2-3 приема. Детям старше 10 лет 0,5-1 г 3 раза в сутки.

2. Выпишите рецепт на **Амоксициллин/клавулановую кислоту** ребенку 4 лет (17 кг) для лечения инфекции мочевыводящих путей

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Amoxicillin/ clavulanic acid	Пор. д/приг. сусп. д/приемап/о (флак.) (125мг/31,25мг/5мл) 25г, (250мг/62,5мг/5мл) 25 г. Табл. покр. обол. 375 мг (250мг амоксиклава и 125 мг клавулановой кислоты), 625 мг (500 мг + 125 мг), 1000 мг (875 мг + 125 мг)	45-90 мг/кг/сутки (по амоксициллину) внутрь в 2-3 приема Дети старше 12 лет: 1,5-2 г/сутки (по амоксициллину) в 2-3 приема

- Выпишите рецепт на **Амоксициллин/клавулановую** ребенку 5 лет (20 кг) для лечения пневмонии

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
-----	---------------	----------------------

Amoxicillin/ clavulanic acid	Пор. д/приг. сусп. д/приемап/о (флак.) (125мг/31,25мг/5мл) 25г, (250мг/62,5мг/5мл) 25 г. Табл. покр. обол. 375 мг (250мг амоксиклава и 125 мг клавулановой кислоты), 625 мг (500 мг + 125 мг), 1000 мг (875 мг + 125 мг)	45-90 мг/кг/сутки (по амоксициллину) внутрь в 2-3 приема Дети старше 12 лет: 1,5-2 г/сутки (по амоксициллину) в 2-3 приема
---------------------------------	---	---

3. Выпишите рецепт на **Цефазолин** ребенку 4 лет (18 кг) для лечения стрептодермии

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Cefazolin	Пор. для приг. р-ра (флак.) 0,5; 1,0 г	50-100 мг/кг/сут в 3 приема в/м, в/в. Максимально до 4 г/сутки

4. Выпишите рецепт на **Цефтриаксон** ребенку 5 лет (20 кг) для лечения внебольничной пневмонии

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Ceftriaxone	Пор. для приг. р-ра для в/в и в/м введения (флак.) 0,25 г, 0,5 г, 1,0 г	Оптимальная доза 50-80 мг/кг/сутки 1 раз в сутки (детям с весом более 50 кг — до 2 г/сутки)

Выпишите рецепт на **Цефтриаксон** ребенку 8 лет (28 кг) для лечения острого синусита

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Ceftriaxone	Пор. для приг. р-ра для в/в и в/м введения (флак.) 0,25 г, 0,5 г, 1,0 г	Оптимальная доза 50-80 мг/кг/сутки 1 раз в сутки (детям с весом более 50 кг — до 2 г/сутки)

5. Выпишите рецепт на **Цефтибутен** ребенку 8 лет (28 кг) для лечения обострения хронического тонзиллита

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Ceftibuten	Капс. 400 мг Пор. д/приг. сусп. для приема п/о (флак.) 36 мг/мл	9 мг/кг/сут в 1-2 приема (максимальная суточная доза 400 мг)

6. Выпишите рецепт на **цефиксим** ребенку 10 лет (32 кг) для лечения обострения хронического пиелонефрита

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Cefixime	Гран. д/приг. сусп. д/приемап/о (флак.) 100мг/5мл Капс. 200 мг, 400 мг	детям от 6 мес 8 мг/кг/сут в 1 – 2 приема (максимальная доза 400 мг)

Выпишите рецепт на **цефиксим** ребенку 9 лет (30 кг) для лечения острого синусита.

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования

Cefixime	Гран. д/приг. сусп. д/приема п/о (флак.) 100мг/5мл Капс. 200 мг, 400 мг	детям от 6 мес 8 мг/кг/сут в 1 – 2 приема (максимальная доза 400 мг)
----------	---	--

7. Выпишите рецепт на **азитромицин** ребенку 4 лет (17 кг) для лечения внебольничной пневмонии

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Azithromycin	Пор. д/приг. сусп. д/приема п/о (флак.) 100мг/5мл Табл., покр. обол., 125 мг, 500 мг.	детям от 6 мес 10 мг/кг 1 раз в сутки (детям с весом более 45 кг — 500 мг) за 1 час до или через 2 часа после еды; для лечения стрептококкового тонзиллита/ фарингита 20 мг/кг/сут (курсовая доза до 60 мг/кг)

- Выпишите рецепт на **азитромицин** ребенку 8 лет (27 кг) для лечения стрептококкового тонзиллита

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Azithromycin	Пор. д/приг. сусп. д/приема п/о (флак.) 100мг/5мл Табл., покр. обол., 125 мг, 500 мг.	детям от 6 мес 10 мг/кг 1 раз в сутки (детям с весом более 45 кг — 500 мг) за 1 час до или через 2 часа после еды; для лечения стрептококкового тонзиллита/ фарингита 20 мг/кг/сут (курсовая доза до 60 мг/кг)

8. Выпишите рецепт на **джозамицин** ребенку 8 лет (28 кг) для лечения атипичной пневмонии

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Josamycin	Гранулы д/приг. сусп. для приема внутрь 125 мг/5 мл, 250мг/5мл, 500 мг/5 мл (флак.) Таб. диспергируемые 1 г	50 мг/кг/сутки в 2 приема, старше 14 лет 1-2 г (максимально 3 г) в сутки в 2-3 приема

9. Выпишите рецепт на **кларитромицин** ребенку 6 лет (24 кг) для лечения хламидийной инфекции

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Clarithromycin	Табл., покр. обол. 250 мг, 500 мг. Гранулы д/приг. сусп. для приема п/о 125 мг/мл, 250 мг/мл	15 мг/кг/сут в 2 приема (максимально 500 мг 2 раза в день)

Выпишите рецепт на **кларитромицин** ребенку 12 лет (38 кг) для проведения антигеликобактерной терапии.

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Clarithromycin	Табл., покр. обол. 250 мг, 500 мг. Гранулы д/приг. сусп. для приема п/о 125 мг/мл, 250 мг/мл	15 мг/кг/сут в 2 приема (максимально 500 мг 2 раза в день)

10. Выпишите рецепт на **фуразидин** ребенку 5 лет (20 кг) для лечения инфекции мочевыводящих путей

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Furazidin	Табл. 50 мг	Дети старше 3 лет: 25-50 мг 3 раза в сутки (но не более 5 мг/кг/сутки)

11. Выпишите рецепт на **нифуроксазид** ребенку 4 лет (18 кг) для терапии кишечной инфекции.

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Nifuroxazide	Капс. 100 мг Сусп. для приема п/о 200 мг/5 мл (флак.) 90 мл	Детям от 1 месяца до 6 мес – по 2,5 мл суспензии внутрь 2-3 раза в сутки, от 6 мес до 3 лет – по 2,5 мл 3 раза в сутки, от 3 до 6 лет – 5 мл 3 раза в сутки, 6-18 лет по 5 мл 3-4 раз/сут. Курс лечения не более 7 дней.

Противогельминтные препараты

12. Выпишите рецепт на **мебендазол** ребенку 5 лет для лечения аскаридоза

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Mebendazole	Табл. 100 мг	детям старше 3 лет при энтеробиозе – 100 мг однократно, при аскаридозе, трихоцефалезе, анкилостомозе, смешанных инвазиях – 100 мг 2 раза в сутки (утро, вечер) 3 дня

Выпишите рецепт на **мебендазол** ребенку 2 лет для лечения энтеробиоза

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Mebendazole	Табл. 100 мг	детям старше 3 лет при энтеробиозе – 100 мг однократно, при аскаридозе, трихоцефалезе, анкилостомозе, смешанных инвазиях – 100 мг 2 раза в сутки (утро, вечер) 3 дня

13. Выпишите рецепт на **албендазол** ребенку 6 лет для лечения энтеробиоза

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Albendazole	Сусп. для приема п/о 100 мг/5мл, фл. 20 мл Табл., покр. обол. 200 и 400мг	При аскаридозе детям от 1 года с массой тела менее 60 кг – 15 мг/кг, более 60 кг – 400 мг однократно. При энтеробиозе детям от 1 года до 2 лет 200 мг однократно, старше 2 лет – 400 мг однократно.

Выпишите рецепт на **албендазол** ребенку 4 лет для лечения аскаридоза

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Albendazole	Сусп. для приема п/о 100мг/5 мл, фл. 20 мл Табл., покр. обол. 200 и400мг	При аскаридозе детям от 1 года с массой тела менее 60 кг – 15 мг/кг, более 60 кг – 400 мг однократно. При энтеробиозе детям от 1 года до 2 лет 200 мг однократно, старше 2 лет – 400 мг однократно.

Противовирусные препараты

14. Выпишите рецепт на **умифеновир** ребенку 3 лет (15 кг) для лечения острой респираторной вирусной инфекции

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Umifenovir	Пор. д/приг. сусп. д/приема п/о (флак.) 25мг/5мл Табл. покр. обол. 50 мг, 100 мг Капс. 50 мг, 100 мг, 200 мг	Внутрь, до еды разовая доза детям 2-6 лет – 50 мг, 6-12 лет – 100 мг, старше 12 лет – 200 мг. Для лечения 4 раза в день 5 дней, для профилактики 2 раза в неделю в течение 3 недель, при контакте с больным 1 раз в день 10-14 дней.

Выпишите рецепт на **умифеновир** ребенку 5 лет (20 кг) для профилактики острой респираторной вирусной инфекции

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Umifenovir	Пор. д/приг. сусп. д/приема п/о (флак.) 25мг/5мл Табл. покр. обол. 50 мг, 100 мг Капс. 50 мг, 100 мг, 200 мг	Внутрь, до еды разовая доза детям 2-6 лет – 50 мг, 6-12 лет – 100 мг, старше 12 лет – 200 мг. Для лечения 4 раза в день 5 дней, для профилактики 2 раза в неделю в течение 3 недель, при контакте с больным 1 раз в день 10-14 дней.

15. Выпишите рецепт на **осельтамивир** ребенку 1,5 лет (12 кг) для лечения гриппа

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования

Осельтамивир Oseltamivir	Капс. 75 мг Пор. д/приг. сусп. д/приема п/о 12 мг/мл (фл.)	Детям старше 1 года (масса до 15 кг) – 30 мг 2 р/сут, 15-23 кг – 45 мг 2 р/сут, 23-40 кг – 60 мг 2 р/сут, более 40 кг - 75 мг для лечения 2 раза в день 10 дней, для профилактики после контакта с больным 1 раз в день 10 дней, в период эпидемии до 6 недель.
-----------------------------	--	--

Выпишите рецепт на **осельтамивир** ребенку 5 лет (20 кг) для профилактики после контакта с больным гриппом.

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Осельтамивир Oseltamivir	Капс. 75 мг Пор. д/приг. сусп. д/приема п/о 12 мг/мл (фл.)	Детям старше 1 года (масса до 15 кг) – 30 мг 2 р/сут, 15-23 кг – 45 мг 2 р/сут, 23-40 кг – 60 мг 2 р/сут, более 40 кг - 75 мг для лечения 2 раза в день 10 дней, для профилактики после контакта с больным 1 раз в день 10 дней, в период эпидемии до 6 недель.

16. Выпишите рецепт на **интерферон-альфа-2b** ребенку 6 месяцев (масса тела 7 кг) для терапии острой респираторной вирусной инфекции

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Interferon alfa-2b	Сусп. ректальные 150 тыс. МЕ, 500 тыс. МЕ	Детям до 7 лет по 150 000 МЕ 2 р/д (через 12 часов), курс 5 дней, старше 7 лет – 500 000 МЕ 2 раза в день (через 12 часов) 5 дней.

17. Выпишите рецепт на **ацикловир** для местной терапии герпетической инфекции ребенку 11 лет (35 кг)

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Aciclovir	Мазь 5%, тубы 5 г, 10 г	Наружно 5 раз день 4-10 дней.

Выпишите рецепт на **ацикловир** для лечения герпетической инфекции ребенку 5 лет (20 кг)

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Aciclovir	Табл. 200 мг	Детям с 3 лет внутрь 200 мг 5 раз в день (каждые 4 часа кроме ночного сна).

Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов дыхания и аллергических заболеваниях

Бронхолитики

18. Выпишите рецепт на **ипратропия бромид/ фенотерол** подростку 13 лет (масса тела 42 кг) для терапии обструктивного синдрома

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Ipratropium bromide/Fenoterol	Р-р д/инг. (флак.) 20 мл (250мкг ипратропия бромида, 500 мкг фенотерола в 1 мл)	Детям до 6 лет (до 22 кг) 0,1 мл (2 капли)/ кг, не более 0,5 мл (10 капель); 6-12 лет – 0,5-2 мл (20-40 кап); старше 12 лет – 1 - 2,5 мл (20-50 капель) до 4 раз в сутки. Рекомендованная доза разводится в 0,9% растворе хлорида натрия до общего объема 3-4 мл и ингалируется через небулайзер в течение 6-7 минут

Выпишите рецепт на **ипратропия бромид/фенотерол** ребенку 4 лет (масса тела 17 кг) для терапии обструктивного синдрома.

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Ipratropium bromide/Fenoterol	Р-р д/инг. (флак.) 20 мл (250мкг ипратропия бромида, 500 мкг фенотерола в 1 мл)	Детям до 6 лет (до 22 кг) 0,1 мл (2 капли)/ кг, не более 0,5 мл (10 капель); 6-12 лет – 0,5-2 мл (20-40 кап); старше 12 лет – 1 - 2,5 мл (20-50 капель) до 4 раз в сутки. Рекомендованная доза разводится в 0,9% растворе хлорида натрия до общего объема 3-4 мл и ингалируется через небулайзер в течение 6-7 минут

19. Выпишите рецепт на **Сальбутамол** ребенку 9 лет (масса тела 28 кг) для купирования приступа бронхиальной астмы

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Salbutamol	Аэроз. д/инг. доз. 12 мл, 200 доз (1 доза – 100 мкг)	100 – 200 мкг (1 – 2 дозы) до 4 раз в сутки

Ингаляционные кортикостероиды и комбинированные препараты

20. Выпишите рецепт на **флутиказон** ребенку 6 лет (масса тела 22 кг) для базисной терапии бронхиальной астмы

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Fluticasone	Аэроз. д/инг. доз 60 или 120 доз (50, 125 и 250 мкг/доза).	Дети 1-4 лет – 100 мкг 2 р/день, 4 - 16 лет – 50-100 мкг 2 р/день, старше 16 лет 100-1000 мкг 2 раза в сутки: при легком течении 100-250 мкг; средней тяжести – 250-500 мкг; тяжелом течении – 500-

		1000 мг.
--	--	----------

21. Выпишите рецепт на **будесонид** ребенку 2 лет (масса тела 14 кг) для лечения острого стенозирующего ларинготрахеита

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Budesonide	Сусп. д/инг. доз. 2 мл (0,25 и 0,5 мг/мл).	Детям от 6 мес до 12 лет – 0,25- 0,5 мг 2 раза в сутки, старше 12 лет 0,5 – 1 мг 2 раза в сутки (при необходимости предварительно разбавить 2 мл 0,9% раствора хлорида натрия). При стенозирующем ларинготрахеите детям от 6 мес - 2 мг/сут в 1-2 приема с интервалом 30 минут.

Выпишите рецепт на **будесонид** ребенку 9 лет (масса тела 30 кг) для терапии бронхиальной астмы

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Budesonide	Сусп. д/инг. доз. 2 мл (0,25 и 0,5 мг/мл).	Детям от 6 мес до 12 лет – 0,25- 0,5 мг 2 раза в сутки, старше 12 лет 0,5 – 1 мг 2 раза в сутки (при необходимости предварительно разбавить 2 мл 0,9% раствора хлорида натрия). При стенозирующем ларинготрахеите детям от 6 мес - 2 мг/сут в 1-2 приема с интервалом 30 минут.

22. Выпишите рецепт на **салметерол/флутиказон** ребенку 8 лет (масса тела 27 кг) для базисной терапии бронхиальной астмы

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Salmeterol/Fluticasone	Аэроз. д/инг. доз. 25 мкг/50 мкг, 25 мкг/125 мкг, 25мкг/250 мкг	Дети с 4 до 12 лет: 2 ингаляции (25 мкг/50 мкг) 2 р/сут, старше 12 лет 2 ингаляции (25+50 или 25+125 или 25+250 мкг) 2 раза в сутки.

23. Выпишите рецепт на **будесонид/формотерол** ребенку 10 лет (масса тела 35 кг) для базисной терапии бронхиальной астмы

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Budesonide / Formoterol	Пор. д/инг. доз. 4,5 мкг/ 80 мкг, 4,5 мкг/ 160 мкг	Детям с 6 до 12 лет: 4,5мкг/80мкг/доза – 1-2 дозы 2 р/сут; 12 лет и старше – 4,5 мкг/80 мкг/доза или 4,5 мкг/160 мкг/доза – 1-2 дозы 2

		р/сут
--	--	-------

Муколитики

24. Выпишите рецепт на **амброксол** для приема внутрь ребенку 7 лет (масса тела 25 кг) с пневмонией

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Ambroxol	Сироп (флак.) 100 мл (15мг/5мл, 30мг/5мл). Раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл, фл. 100 мл (1 мл – 25 капель) Таблетки 30 мг	Детям до 2 лет – 7,5 мг 2 р/сут., от 2 до 6 лет – 7,5 мг 3 р/сут., от 6 до 12 лет – 15 мг 2-3 р/сут., старше 12 лет – 30 мг 3 р/сут во время еды, запивая жидкостью. Ингаляции детям до 6 лет по 2 мл р-ра 1-2 раза в сутки, старше 6 лет и взрослые по 2-3 мл 1-2 раза в сутки, смешивая с физ. р-ром в соотношении 1:1.

Выпишите рецепт на **амброксол** для ингаляций ребенку 5 лет (масса тела 20 кг) с пневмонией

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Ambroxol	Сироп (флак.) 100 мл (15мг/5мл, 30мг/5мл). Раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл, фл. 100 мл (1 мл – 25 капель) Таблетки 30 мг	Детям до 2 лет – 7,5 мг 2 р/сут., от 2 до 6 лет – 7,5 мг 3 р/сут., от 6 до 12 лет – 15 мг 2-3 р/сут., старше 12 лет – 30 мг 3 р/сут во время еды, запивая жидкостью. Ингаляции детям до 6 лет по 2 мл р-ра 1-2 раза в сутки, старше 6 лет и взрослые по 2-3 мл 1-2 раза в сутки, смешивая с физ. р-ром в соотношении 1:1.

Выпишите рецепт на **амброксол** для приема внутрь ребенку 2 лет (масса тела 12 кг) с острым бронхитом

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Ambroxol	Сироп (флак.) 100 мл (15мг/5мл, 30мг/5мл). Раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл, фл. 100 мл (1 мл – 25 капель) Таблетки 30 мг	Детям до 2 лет – 7,5 мг 2 р/сут., от 2 до 6 лет – 7,5 мг 3 р/сут., от 6 до 12 лет – 15 мг 2-3 р/сут., старше 12 лет – 30 мг 3 р/сут во время еды, запивая жидкостью. Ингаляции детям до 6 лет по 2 мл р-ра 1-2 раза в сутки, старше 6 лет и взрослые по 2-3 мл 1-2 раза в сутки, смешивая с физ. р-ром в соотношении 1:1.

25. Выпишите рецепт на **ацетилцистеин** ребенку 6 лет (22 кг) в комплексной терапии пневмонии

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Acetylcysteine	Гранулы для приг. р-ра для приема внутрь 100мг, 200 мг (пакет) Раствор для приема внутрь 20 мг/мл, фл. 100мл, 200 мл	Детям от 2 до 6 лет 100мг 2-3 р/сут, 6 – 14 лет 100 мг 3 р/сут или 200 мг 2 раз/сут, старше 14 лет – 200 мг 2-3 р/сут.

26. Выпишите рецепт на **аммония глицирризинат** ребенку 4 лет (масса тела 17 кг) с острым бронхитом

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Ammonium glycyrrhizate	Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 25 мг (пакет) Таблетки 50 мг	внутри через 30 минут после еды, растворив содержимое пакета в 1 стол ложке (15 мл) теплой воды (разовая доза); детям 5 мес – 3 лет – 3 раза в сутки, 3-5 лет – 3 раза в сутки, 5-10 лет – 3-4 раза в сутки, старше 10 лет – по 1-2 табл. 2 раза в день

Противокашлевые препараты

27. Выпишите рецепт на **бутамират** ребенку 3 лет (масса тела 15 кг) с трахеитом

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Butamirate	Сироп 1,5 мг/мл, фл. 50 и 100 мл Раствор для приема внутрь 1,5 мг/мл, фл. 100, 150 и 200 мл Табл. покр. обол 20 мг Капли д/пр внутрь 5 мг/мл, фл. 20 мл	Дети 3-6 лет 7,5 мг 3 раза в день, 6-12 лет – 15 мг 3 раза в день, старше 12 лет – 22,5 мг 3 раза в день. Максимальная суточная доза 90 мг. Детям 2 мес – 1 года – по 10 кап 4 р/сут, 1 год – 3 года – 15 кап 4 р/сут, старше 3 лет – 25 кап 4 р/сут.

28. Выпишите рецепт на **леводропропизин** ребенку 5 лет (масса тела 20 кг) с трахеобронхитом

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Levodropropizine	Сироп 6 мг/мл, фл. 120 мл, 200 мл	Детям от 10 до 20 кг (старше 2 лет) по 3 мл 3 р/сут, 20-30 кг – по 5 мл 3 р/сут, более 30 кг – по 10 мл 3 раза в день

Антилейкотриеновые препараты

29. Выпишите рецепт на **монтелукаст** ребенку 4 лет (масса тела 16 кг) с аллергическим ринитом

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Montelukast	Табл. жеват. 4 мг, 5 мг Табл. покр. обол 10 мг	Дети 2-5 лет табл. 4 мг вечером, 6-14 лет – табл. 5 мг вечером, старше 14 лет – табл. 10 мг.

Антигистаминные препараты

30. Выпишите рецепт на **цетиризин** ребенку 5 лет (масса тела 20 кг) для лечения атопического дерматита

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Cetirizine	Капли для приема внутрь 10 мг /1 мл, фл. 10, 20 мл. Табл., покр. обол. 10 мг	Детям 6 – 12 мес – 2,5 мг (5 капель) 1 р/сут, 1-2 года – 2,5 мг 2 р/сут, 2-6 лет – 5 мг (10 капель) в 1-2 приема, старше 6 лет – по 10 мг/сут (20 кап.) в 1-2 приема

Выпишите рецепт на **цетиризин** ребенку 7 месяцев (масса тела 8 кг) для лечения атопического дерматита

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Cetirizine	Капли для приема внутрь 10 мг /1 мл, фл. 10, 20 мл. Табл., покр. обол. 10 мг	Детям 6 – 12 мес – 2,5 мг (5 капель) 1 р/сут, 1-2 года – 2,5 мг 2 р/сут, 2-6 лет – 5 мг (10 капель) в 1-2 приема, старше 6 лет – по 10 мг/сут (20 кап.) в 1-2 приема

Выпишите рецепт на **цетиризин** ребенку 8 лет (масса тела 28 кг) для лечения острой аллергической реакции (крапивница)

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Cetirizine	Капли для приема внутрь 10 мг /1 мл, фл. 10, 20 мл. Табл., покр. обол. 10 мг	Детям 6 – 12 мес – 2,5 мг (5 капель) 1 р/сут, 1-2 года – 2,5 мг 2 р/сут, 2-6 лет – 5 мг (10 капель) в 1-2 приема, старше 6 лет – по 10 мг/сут (20 кап.) в 1-2 приема

31. Выпишите рецепт на **лоратадин** ребенку 10 лет (32 кг) для лечения атопического дерматита.

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Loratadine	Сироп (флак.) 100 мл (5 мг/5 мл). Табл. 10 мг	Детям от 2 до 12 лет с массой тела менее 30 кг – 5 мг/сут. в 1 прием. Детям с массой тела более 30 кг – по 10 мг 1 раз в сутки.

Выпишите рецепт на **лоратадин** ребенку 4 лет (18 кг) для лечения аллергической реакции.

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Loratadine	Сироп (флак.) 100 мл (5 мг/5 мл). Табл. 10 мг	Детям от 2 до 12 лет с массой тела менее 30 кг – 5 мг/сут. в 1 прием. Детям с массой тела более 30 кг – по 10 мг 1 раз в сутки.

Выпишите рецепт на **лоратадин** ребенку 2 лет (13 кг) для лечения атопического дерматита.

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Loratadine	Сироп (флак.) 100 мл (5 мг/5 мл). Табл. 10 мг	Детям от 2 до 12 лет с массой тела менее 30 кг – 5 мг/сут. в 1 прием. Детям с массой тела более 30 кг – по 10 мг 1 раз в сутки.

32. Выпишите рецепт на **дезлоратадин** ребенку 6 лет (масса тела 22 кг) для лечения аллергического ринита

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Desloratadine	Табл. покр. обол. 5 мг Сироп 0,5 мг/мл, фл. 150 мл Раствор д/приема внутрь 0,5 мг/мл, фл. 60 мл и 120 мл	Детям 6-12 мес – 1 мг (2 мл) 1 р/сут, 1 год – 5лет - 1,25 мг (2,5 мл) 1 р/сут, 6 – 11 лет – 2,5 мг (5 мл) 1 р\сут, старше 12 лет 5 мг (10 мл) 1 раз/сут.

33. Выпишите рецепт на **диметинден** ребенку 3 месяцев (масса тела 5 кг) для терапии аллергической реакции

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Dimetindene	Капли д/приема внутрь 1 мг/мл, фл. 20 мл	Детям 1 мес – 12 лет 0,1 мг/кг (2 капли/кг) в сутки в 3 приема; старше 12 лет – 20-40 капель 3 р/сут

Противовоспалительные средства

Глюкокортикостероиды

34. Выпишите рецепт на **преднизолон** внутрь ребенку 10 лет (масса тела 30 кг) с тяжелым обострением бронхиальной астмы

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Prednisolone	Табл. 5 мг	Начальная доза 0,5-1 мг/кг/сутки в 2-3 приема, поддерживающая 0,3-0,6 мг/кг/сут.

Выпишите рецепт на **преднизолон** для парентерального введения ребенку 1 года (10 кг) для купирования ангионевротического отека

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Prednisolone	Р-р для в/в и в/м введения 30 мг/мл, амп. 1 мл	Детям 2-12 мес – разовая доза 2-3 мг/кг, 1-14 лет – 1-2 мг/кг, при шоке 2-5 мг/кг в/в струйно медленно или глубоко в/м.

Нестероидные противовоспалительные препараты

35. Выпишите рецепт на **ибупрофен** ребенку 2 лет (14 кг) в качестве жаропонижающего средства

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Ibuprofen	Сусп. д/приема п/о (флак.) 100 мл (100мг/5мл). Таблетки 200 мг, 400 мг	Разовая доза 5 - 10 мг/кг до 4 р/сут, не более 30 мг/кг/сут с интервалами 6-8 часов

Выпишите рецепт на **ибупрофен** ребенку 9 лет (30 кг) в качестве жаропонижающего средства

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Ibuprofen	Сусп. д/приема п/о (флак.) 100 мл (100мг/5мл). Таблетки 200 мг, 400 мг	Разовая доза 5 - 10 мг/кг до 4 р/сут, не более 30 мг/кг/сут с интервалами 6-8 часов

Выпишите рецепт на **ибупрофен** ребенку 6 мес (7 кг) в терапии острого среднего отита

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Ibuprofen	Сусп. д/приема п/о (флак.) 100 мл (100мг/5мл). Таблетки 200 мг, 400 мг	Разовая доза 5 - 10 мг/кг до 4 р/сут, не более 30 мг/кг/сут с интервалами 6-8 часов

36. Выпишите рецепт на **Парацетамол** ребенку 3 месяцев (5 кг) в качестве жаропонижающего средства

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
-----	---------------	----------------------

Paracetamol	Сусп. д/приема п/о (флак.) 100 мл (120мг/5мл) Табл. 200 мг, 500 мг Сусп. рект. 50 мг, 100 мг, 250 мг, 500 мг	Разовая доза 10-15 мг/кг каждые 4-6 часов, максимально 60 мг/кг/сут. Старше 12 лет 500-1000 мг 4 раза в сутки.
-------------	---	--

Выпишите рецепт на **Парацетамол** ребенку 7 лет (25 кг) в качестве жаропонижающего средства

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Paracetamol	Сусп. д/приема п/о (флак.) 100 мл (120мг/5мл) Табл. 200 мг, 500 мг Сусп. рект. 50 мг, 100 мг, 250 мг, 500 мг	Разовая доза 10-15 мг/кг каждые 4-6 часов, максимально 60 мг/кг/сут. Старше 12 лет 500-1000 мг 4 раза в сутки.

Лекарственные препараты, применяемые в гастроэнтерологии

Спазмолитики

37. Выпишите рецепт на **дротаверин** ребенку 7 лет (масса тела 25 кг) с абдоминальным болевым синдромом

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Drotaverine	Табл. 40 и 80 мг Р-р для в/в и в/м введения 20 мг/мл, амп. 2 мл	Детям до 6 лет назначают по 10-20 мг 1-2 раза в сутки, старше 6 лет – по 20 мг 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза для детей от 6 до 12 лет 80, старше 12 лет – 160 мг. В/м 0,1 – 0,2 мл /год жизни

Выпишите рецепт на **дротаверин** ребенку 9 лет (масса тела 28 кг) с хроническим колитом

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Drotaverine	Табл. 40 и 80 мг Р-р для в/в и в/м введения 20 мг/мл, амп. 2 мл	Детям до 6 лет назначают по 10-20 мг 1-2 раза в сутки, старше 6 лет – по 20 мг 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза для детей от 6 до 12 лет 80, старше 12 лет – 160 мг. В/м 0,1 – 0,2 мл /год жизни

38. Выпишите рецепт на **папаверин** ребенку 6 лет (масса тела 22 кг) с абдоминальным болевым синдромом

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
-----	---------------	----------------------

Papaverine	Табл. 40 мг Р-р для инъекций 20 мг/мл, амп. 2 мл	Детям с 10 лет 20 мг 3-4 р/сут. Детям с 6 мес до 12 лет максимальная разовая доза 0,3 мг/кг, с 12 лет – 20-40 мг, интервал между введениями не менее 4 ч
------------	--	--

39. Выпишите рецепт на **гиосцина бутилбромид** ребенку 10 лет (масса тела 32 кг) с синдромом раздраженного кишечника

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Hyoscine butylbromide	Табл. покр. обол. 10 мг Супп. рект. 10 мг	Детям с 6 лет 1-2 табл. (супп.) 3-5 р/сут, максимально 100 мг/сут

40. Выпишите рецепт на **тримебутин** ребенку 4 лет (масса тела 16 кг) в терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Trimebutine	Гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь 25 мг, 100 мг (пакет) Табл. 100 мг, 200 мг	Детям 3-5 лет – по 25 мг 3 р/сут; 5-12 лет – по 50 мг 3 р/сут, с 12 лет – 100-200 мг 3 раза в сутки. Содержимое пакета перемешать в 100 мл воды.

Ингибиторы протонной помпы

41. Выпишите рецепт на **омепразол** ребенку 10 лет (30 кг) для лечения язвенной болезни

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Omeprazole	Капс. 10 мг, 20 мг	Детям старше 2 лет (масса более 20 кг) 20 мг 1 р/сут или 1 мг/кг/сут, высшая суточная доза 40 мг. Капсулу можно растворить в воде или соке.

Выпишите рецепт на **омепразол** ребенку 8 лет (27 кг) для лечения эрозивного гастродуоденита

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Omeprazole	Капс. 10 мг, 20 мг	Детям старше 2 лет (масса более 20 кг) 20 мг 1 р/сут или 1 мг/кг/сут, высшая суточная доза 40 мг. Капсулу можно растворить в воде или соке.

42. Выпишите рецепт на **эзомеразол** ребенку 7 лет (масса тела 25 кг) для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Esomeprazole	Пеллеты, гранулы д/приг. сусп. д/према внутрь 10 мг Капс. 10 мг, 20 мг, 40 мг Табл. покр. обол. 20 мг, 40 мг	Детям старше 1 года, с массой 10-20 кг – 10 мг 1 р/сут, больше 20 кг 10-20 мг 1 р/сут, старше 12 лет 20-40 мг 1 р/сут.; в составе эрадикационной терапии 2 р/сут. Детям старше 12 лет 20-40 мг 1 р/сут

Препараты пищеварительных ферментов

43. Выпишите рецепт на **панкреатин** ребенку 3 лет (масса тела 15 кг) с муковисцидозом

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Pancreatin	Капс. кишечнорастворимые 10000 ЕД, 25000 ЕД, 40000 ЕД Табл. кишечнорастворимые покр. обол. 10000 ЕД, 20000 ЕД	Для частичной заместительной терапии 300-500 ЕД липазы/кг на 1 прием пищи 3 р/сут. При абсолютной панкреатической недостаточности – 1000 ЕД липазы/кг на каждый прием пищи детям до 4 лет, 500 ЕД липазы /кг на прием пищи старше 4 лет; максимально 10000 ЕД липазы/кг. Содержимое капсулы можно перемешать с кислой пищей или жидкостью.

Выпишите рецепт на **панкреатин** ребенку 7 лет (масса тела 25 кг) для частичной заместительной терапии при панкреатите

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Pancreatin	Капс. кишечнорастворимые 10000 ЕД, 25000 ЕД, 40000 ЕД Табл. кишечнорастворимые покр. обол. 10000 ЕД, 20000 ЕД	Для частичной заместительной терапии 300-500 ЕД липазы/кг на 1 прием пищи 3 р/сут. При абсолютной панкреатической недостаточности – 1000 ЕД липазы/кг на каждый прием пищи детям до 4 лет, 500 ЕД липазы /кг на прием пищи старше 4 лет; максимально 10000 ЕД липазы/кг. Содержимое капсулы можно перемешать с кислой пищей или жидкостью.

Слабительные препараты

44. Выпишите рецепт на **лактuloзу** для лечения запоров ребенку 8 месяцев (масса тела 9 кг)

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Лактулоза Lactulose	Сироп 667 мг/мл, фл. 100 мл, 200 мл, 500 мл	Начальная суточная доза детям до 1 года – 5 мл, 1-6 лет – 5-10 мл, 7 – 14 лет – 15 мл, старше 15 лет – 45 мл.

Гепатопротекторы и препараты для лечения холестаза

45. Выпишите рецепт на **урсодезоксихолевую кислоту** ребенку 10 лет (масса тела 50 кг) для лечения стеатогепатита

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Урсодезоксихолевая кислота Ursodeoxycholic acid	Суспензия д/приема внутрь 250 мг/5 мл, фл. 250 мл Капс. 250 мг Табл. покр. обол. 500 мг	Лечение гепатитов 10-15 мг/кг/сут в 2-3 приема; Муковисцидоз – 20-30 мг/кг/сут в 2-3 приема; Дискинезия желчных путей, растворение камней 10 мг/кг/сут в 1-2 приема

Пробиотики

46. Выпишите рецепт на **сахаромицеты буларди** (энтерол) ребенку 3 лет (масса тела 15 кг) для лечения кишечной инфекции

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Сахаромицеты буларди (энтерол) Saccharomyces Boulardii	Пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь 250 мг (пакет) Капс. 250 мг	Детям 1 - 3 лет – 1 пакет (капс.) 2 р/сут, старше 3 лет – 1-2 пакета (капс.) 2 р/сут. Содержимое пакета (капс.) можно перемешать с водой, детским питанием.

Лекарственные препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему

47. Выпишите рецепт на **эналаприл** подростку 15 лет (масса тела 50 кг) для терапии артериальной гипертензии

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Enalapril	Табл. 5 мг, 10 мг, 20 мг	0,08 мг/кг/сут в 1-2 приема, максимально 40 мг/сутки

48. Выпишите рецепт на **нифедипин** подростку 16 лет (60 кг) для купирования гипертонического криза

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования

Nifedipine	Табл. 10 мг	0,25-0,5 мг/кг/сут в 3-4 приема, максимально 3 мг/кг/сут (120 мг/сут)
------------	-------------	---

49. Выпишите рецепт на **атенолол** ребенку 8 лет (27 кг) для лечения аритмии

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Atenolol	Табл. 25, 50 и 100 мг.	1-2 мг/кг/сут в 1-2 приема, подросткам 25-50 мг/сут в 1-2 приема, максимальная суточная доза 100 мг.

50. Выпишите рецепт на **ацетазоламид** ребенку 5 лет (20 кг) для лечения гидроцефалии

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Acetazolamide	Табл. 250 мг	8-30 мг/кг/сут в 1-4 приема, максимально 70 мг/сут; прием препарата по схеме (5 дней прием, 2 дня перерыв)

51. Выпишите рецепт на **фуросемид** для приема внутрь ребенку 6 лет (24 кг) для лечения отечного синдрома.

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Furosemide	Табл. 40 мг Р-р д/ин. (амп.) 1% 2 мл (10 мг/мл)	2 мг/кг/сут в 1-2 приема в первой половине дня, до еды (не более 40 мг/сут). В/в, в/м – 1 мг/кг/сут (не более 20 мг/сут)

52. Выпишите рецепт на **дипиридабол** ребенку 12 лет (40 кг) для лечения васкулита

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Dipiridamole	Табл., покр. обол. 25 мг, 75 мг	2,5 мг/кг 2 раза в день

Препараты железа

53. Выпишите рецепт на **железа гидроксид полимальтозат** внутрь ребенку 1 года (10 кг) для лечения железодефицитной анемии

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Ferric (III) hydroxide polymaltosate	Сироп 10 мг/мл (флак. 150 и 75 мл) Капли для приема внутрь 50 мг/1 мл (флак. 30 мл) Табл. жевательные 100 мг. (100 мг Fe III)	Детям с массой тела менее 15 кг 1-2 капли (2,5-5 мг железа) на 1 кг массы тела; с массой 15-30 кг – 20-40 капель (50-100 мг железа) в сутки для лечения анемии и 10-20 капель – дефицита железа; с массой более 30 кг – 40-120 капель (100-300 мг железа)

		для лечения анемии и 20-40 капель – дефицита железа. Принимают во время или сразу после еды.
--	--	--

Выпишите рецепт на **железа гидроксид полимальтозат** ребенку 3 лет (14 кг) для лечения железодефицитной анемии

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Ferric (III) hydroxide polymaltosate	Сироп 10 мг/мл (флак. 150 и 75 мл) Капли для приема внутрь 50мг/1мл (флак. 30 мл) Табл. жевательные 100 мг. (100 мг Fe III)	Детям с массой тела менее 15 кг 1-2 капли (2,5-5 мг железа) на 1 кг массы тела; с массой 15-30 кг – 20-40 капель (50-100 мг железа) в сутки для лечения анемии и 10-20 капель – дефицита железа; с массой более 30 кг – 40-120 капель (100-300 мг железа) для лечения анемии и 20-40 капель – дефицита железа. Принимают во время или сразу после еды.

Выпишите рецепт на **железа гидроксид полимальтозат** ребенку 5 лет (20 кг) для терапии латентного дефицита железа

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Ferric (III) hydroxide polymaltosate	Сироп 10 мг/мл (флак. 150 и 75 мл) Капли для приема внутрь 50мг/1мл (флак. 30 мл) Табл. жевательные 100 мг. (100 мг Fe III)	Детям с массой тела менее 15 кг 1-2 капли (2,5-5 мг железа) на 1 кг массы тела; с массой 15-30 кг – 20-40 капель (50-100 мг железа) в сутки для лечения анемии и 10-20 капель – дефицита железа; с массой более 30 кг – 40-120 капель (100-300 мг железа) для лечения анемии и 20-40 капель – дефицита железа. Принимают во время или сразу после еды.

Лекарственные препараты, влияющие на ЦНС

54. Выпишите рецепт на **пирацетам** ребенку 8 лет (масса тела 28 кг) для коррекции пониженной обучаемости

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Piracetam	Табл., покр. обол. 400 мг, 800 мг, 1200 мг Капс. 200 мг, 400 мг Раствор для приема внутрь 200 мг/мл, флак. 125 мл	Внутрь во время еды или натощак 30-50 мг/кг/сут в 2 приема (до 17.00). При интеллектуально-мнестических нарушениях 2,4-4,8 г/сут в 2-3 приема

Выпишите рецепт на **пирацетам** подростку 16 лет (56 кг) для лечения последствий черепно-мозговой травмы

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Piracetam	Табл., покр. обол. 400 мг, 800 мг, 1200 мг Капс. 200 мг, 400 мг Раствор для приема внутрь 200 мг/мл, флак. 125 мл	Внутри во время еды или натощак 30-50 мг/кг/сут в 2 приема (до 17.00). При интеллектуально-мнестических нарушениях 2,4-4,8 г/сут в 2-3 приема

55. Выпишите рецепт на **гопантеную кислоту** ребенку 2 лет (12 кг) для лечения последствий перинатального поражения центральной нервной системы

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Gopantenic acid	Раствор д/приема внутрь 100 мг/мл, фл. 100 мл, 200 мл Табл. 250 мг, 500 мг	Детям до 1 года 5-10 мл (0,5-1г) в сутки; 1 – 3 года – 5-12,5 мл (0,5-1,25 г) в сутки, 3 – 7 лет – 7,5-15 мл (0,75-1,5 г) в сутки; старше 7 лет – 10-20 мл (1-2 г) в сутки. Внутри через 15-30 минут после еды.

Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях эндокринной системы

56. Выпишите рецепт на **инсулин аспарт** ребенку 5 лет (20 кг) с сахарным диабетом 1 типа

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Insulin aspart	Р-р для п/к и в/в введения 100 МЕ/мл (картриджи) 3 мл	Инсулин ультракороткого действия, вводят непосредственно перед приемом пищи. Суммарная суточная доза инсулина подбирается под контролем гликемии, ориентировочно 0,5 – 1,0 МЕ/кг/сут., 50-70% от нее обеспечивается инсулином короткого действия.

57. Выпишите рецепт на **инсулин детемир** ребенку 8 лет (28 кг) для лечения сахарного диабета 1 типа

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Insulin detemir	Р-р для п/к введения 100 МЕ/мл (картриджи) 3 мл	Инсулин длительного действия, вводится 1 раз в сутки. Суммарная суточная доза инсулина подбирается под контролем гликемии, ориентировочно 0,5 – 1,0 МЕ/кг/сут. От 30 до 50% суточной дозы обеспечивается инсулином длительного действия.

58. Выпишите рецепт на **левотироксин** ребенку 2 лет (13 кг) с гипотиреозом

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Levothyroxine sodium	Табл. 50 мкг, 75 мкг, 100 мкг, 150 мкг	Врожденный гипотиреоз детям до 6 мес – 10-15 мкг/кг/сут, 6-12 мес – 6-8 мкг/кг/сут, 1-5 лет 5-6 мкг/кг/сут, 6-12 лет – 4-5 мкг/кг/сут, старше 12 лет – 2-3 мкг/кг/сут. Заместительная терапия гипотиреоза 1,6-1,8 мкг/кг в сутки. Суточную дозу принимают утром натощак за 30 минут до еды.

Выпишите рецепт на **левотироксин** ребенку 4 лет (16 кг) с гипотиреозом

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Levothyroxine sodium	Табл. 50 мкг, 75 мкг, 100 мкг, 150 мкг	Врожденный гипотиреоз детям до 6 мес – 10-15 мкг/кг/сут, 6-12 мес – 6-8 мкг/кг/сут, 1-5 лет 5-6 мкг/кг/сут, 6-12 лет – 4-5 мкг/кг/сут, старше 12 лет – 2-3 мкг/кг/сут. Заместительная терапия гипотиреоза 1,6-1,8 мкг/кг в сутки. Суточную дозу принимают утром натощак за 30 минут до еды.

Витамины

59. Выпишите рецепт на **менадиона натрия бисульфит** новорожденному ребенку (масса тела 3 кг) для профилактики геморрагической болезни.

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Menadione sodium bisulfite	Р-р. для в/м введения (амп.) 1 и 2 мл (10мг/1мл)	Новорожденным – в/м 0,1-0,15 мл/кг, до 4 мг/сут.

60. Выпишите рецепт на **колекальциферол** (витамин Д) здоровому доношенному ребенку 7 месяцев (масса тела 8 кг) для профилактики рахита

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Colecalciferol	Капли для приема внутрь 15000 МЕ/мл (флак.) 10мл	Здоровому ребенку с 3-4 нед. до 1 года с профилактической целью 1000 МЕ/сут (2 капли), 1-3 лет - 1500 МЕ/сут (3 капли), 3 – 18 лет - 1000 МЕ/сут. Для лечения рахита 1000-5000 МЕ (2-10 капель) в

		сутки, поддерживающая доза 500-1500 МЕ/сут.
--	--	--

Выпишите рецепт на **колекальциферол** (витамин Д) здоровому доношенному ребенку 1 года 9 месяцев (масса тела 11 кг) для профилактики рахита

МНН	Форма выпуска	Принципы дозирования
Colecalciferol	Капли для приема внутрь 15000 МЕ/мл (флак.) 10мл	Здоровому ребенку с 3-4 нед. до 1 года с профилактической целью 1000 МЕ/сут (2 капли), 1-3 лет - 1500 МЕ/сут (3 капли), 3 – 18 лет - 1000 МЕ/сут. Для лечения рахита 1000-5000 МЕ (2-10 капель) в сутки, поддерживающая доза 500- 1500 МЕ/сут.