

«Тактика лечения переломов стенок орбиты с учетом зрительной функции»

Равшанова Н.А.

Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Кафедра хирургии полости рта и дентальной имплантологии

Актуальность проблемы

Орбитальные переломы являются одной из наиболее распространенных травм средней зоны лица, уступая лишь повреждениям костей носа. По данным Р. Siritongtaworn с соавторами (2001) переломы глазницы составляют 40 % от всех переломов лицевого скелета. А так же число травм орбиты, сопровождающихся переломами ее стенок, неуклонно растет (Неробеев А.И. и соавт., 2012, Груша Я.О., 2009, Kummoona 2010, Yilmaz et al., 2007). Три четверти пострадавших — мужчины.

Цель исследования:
Усовершенствовать диагностику и методы хирургического лечения при переломах стенки орбиты

Список литературы:
Абрамов С.С.,
Болдырев Н.И., Евсеев
А.В. и др.
Изготовление
пластиковых копий
трехмерных объектов
по томографическим
данным // Оптическая
техника. - 1998. - №1
(13). - С. 45-49.
2. Авербах М.И.
Повреждения глаз и
окружающих их
частей. — М., Л., 2005.
- С. 13-14.

Результаты исследования:

1. Разработана хирургическая тактика лечения при переломах стенок орбиты в зависимости от их локализации.
2. Рекомендованы профилактические мероприятия для предотвращения снижения функций зрительного нерва.
3. Внесены уточнения к срокам проведения и хирургическим показаниям

Выводы:

Проведение реконструктивных операций в раннем периоде краниоорбитальной травмы позволяет добиться регресса глазодвигательных нарушений в 98,4%, дистопии глазного яблока – в 82,5%, диплопии – в 86,5% и получить хорошие косметические результаты.