

**Перечень препаратов для итоговой государственной аттестации студентов
6 курса педиатрического факультета**

№	Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Принципы дозирования
Лекарственные препараты для терапии инфекционных заболеваний			
Противомикробные препараты			
1	Амоксициллин Amoxicillin	Гранулы д/приг. сусп. для приема п/о 250мг/5мл (флак.) Пор. д/приг. сусп. для приема п/о 125 мг/5мл, 250мг/5мл, 500 мг/5мл (флак.) Табл. 250 мг, 500 мг Табл. дисперг. 125 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг	45-90 мг/кг/сутки внутрь (максимально — 2 г/сутки) в 2-3 приема. Детям старше 10 лет 0,5-1 г 3 раза в сутки.
2	Амоксициллин/ клавулановая кислота Amoxicillin/ clavulanic acid	Пор. д/приг. сусп. д/приемап/о (флак.) (125мг/31,25мг/5мл) 25г, (250мг/62,5мг/ 5мл) 25 г. Табл. покр. обол. 375 мг (250мг амоксициклава и 125 мг клавулановой кислоты), 625 мг (500 мг + 125 мг), 1000 мг (875 мг + 125 мг)	45-90 мг/кг/сутки (по амоксициллину) внутрь в 2-3 приема Дети старше 12 лет: 1,5-2 г/сутки (по амоксициллину) в 2-3 приема
3	Цефазолин Cefazolin	Пор. для приг. р-ра (флак.) 0,5; 1,0 г	50-100 мг/кг/сут в 3 приема в/м, в/в. Максимально до 4 г/сутки
4	Цефтриаксон Ceftriaxone	Пор. для приг. р-ра для в/в и в/м введения (флак.) 0,25 г, 0,5 г, 1,0 г	20-80 мг/кг/сутки 1 раз в сутки (детям с весом более 50 кг — до 2 г/сутки)
5	Цефтибутен Ceftibuten	Капс. 400 мг Пор. д/приг. сусп. для приема п/о (флак.) 36 мг/мл	9 мг/кг/сут в 1-2 приема (максимальная суточная доза 400 мг)
6	Цефиксим Cefixime	Гран. д/приг. сусп. д/приема п/о (флак.) 100мг/5мл Капс. 200 мг, 400 мг	детям от 6 мес 8 мг/кг/сут в 1 – 2 приема (максимальная доза 400 мг)
7	Азитромицин Azithromycin	Пор. д/приг. сусп. д/приемап/о (флак.) 100мг/5мл Табл., покр. обол., 125 мг, 500 мг.	детям от 6 мес 10 мг/кг 1 раз в сутки (детям с весом более 45 кг — 500 мг) за 1 час до или через 2 часа после еды; для лечения стрептококкового тонзиллита/ фарингита 20 мг/кг/сут (курсовая доза до 60 мг/кг)

8	Джозамицин Josamycin	Гранулы д/приг. сусп. для приема внутрь 125 мг/5 мл, 250мг/5мл, 500 мг/5 мл (флак.) Таб. диспергируемые 1 г	50 мг/кг/сутки в 2 приема, старше 14 лет 1-2 г (максимально 3 г) в сутки в 2-3 приема
9	Кларитромицин Clarithromycin	Табл., покр. обол. 250 мг, 500 мг. Гранулы д/приг. сусп. для приема п/о 125 мг/мл, 250 мг/мл	15 мг/кг/сут в 2 приема (максимально 500 мг 2 раза в день)
10	Фуразидин Furazidin	Табл. 50 мг	Дети старше 3 лет: 25-50 мг 3 раза в сутки (но не более 5 мг/кг/сутки)
11	Нифуроксазид Nifuroxazide	Капс. 100 мг Сусп. для приема п/о 200 мг/5 мл (флак.) 90 мл	Детям от 1 месяца до 6 мес – по 2,5 мл суспензии внутрь 2-3 раза в сутки, от 6 мес до 3 лет – по 2,5 мл 3 раза в сутки, от 3 до 6 лет – 5 мл 3 раза в сутки, 6-18 лет по 5 мл 3-4 раз/сут. Курс лечения не более 7 дней.
	Противогельминтные препараты		
12	Мебендазол Mebendazole	Табл. 100 мг	детям старше 3 лет при энтеробиозе – 100 мг однократно, при аскаридозе, трихоцефалезе, анкилостомозе, смешанных инвазиях – 100 мг 2 раза в сутки (утро, вечер) 3 дня
13	Албендазол Albendazole	Сусп. для приема п/о 20 мг/мл, 100 мг/5 мл, фл. 20 мл Табл., покр. обол. 200 и 400 мг	При аскаридозе детям от 1 года с массой тела менее 60 кг – 15 мг/кг, более 60 кг – 400 мг однократно. При энтеробиозе детям от 1 года до 2 лет 200 мг однократно, старше 2 лет – 400 мг однократно.
	Противовирусные препараты		
14	Умифеновир Umifenovir	Пор. д/приг. сусп. д/приема п/о (флак.) 25мг/5мл Табл. покр. обол. 50 мг, 100 мг Капс. 50 мг, 100 мг, 200 мг	Внутрь, до еды разовая доза детям 2-6 лет – 50 мг, 6-12 лет – 100 мг, старше 12 лет – 200 мг. Для лечения 4 раза в день 5 дней, для профилактики 2 раза в неделю в течение 3 недель, при контакте с больным 1 раз в день 10-14 дней.

15	Осельтамивир Oseltamivir	Капс. 75 мг Пор. д/приг. сусп. д/приема п/о 12 мг/мл (фл.)	Детям старше 1 года (масса до 15 кг) – 30 мг 2 р/сут, 15-23 кг – 45 мг 2 р/сут, 23-40 кг – 60 мг 2 р/сут, более 40 кг - 75 мг для лечения 2 раза в день 10 дней, для профилактики после контакта с больным 1 раз в день 10 дней, в период эпидемии до 6 недель.
16	Интерферон-альфа-2b Interferon alfa-2b	Сусп. ректальные 150 тыс. МЕ, 500 тыс. МЕ	Детям до 7 лет по 150 000 МЕ 2 р/д (через 12 часов), курс 5 дней, старше 7 лет – 500 000 МЕ 2 раза в день (через 12 часов) 5 дней.
17	Ацикловир Aciclovir	Мазь 5%, тубы 5 г, 10 г	Наружно 5 раз в день 4-10 дней.
		Табл. 200 мг	Детям с 3 лет внутрь 200 мг 5 раз в день (каждые 4 часа кроме ночного сна).
Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов дыхания и аллергических заболеваниях			
18	Ипратропия бромид/ фенотерол Ipratropium bromide/Fenoterol	Р-р д/инг. (флак.) 20 мл (250мкг ипратропия бромиды, 500 мкг фенотерола в 1 мл)	Детям до 6 лет (до 22 кг) 0,1 мл (2 капли)/кг, не более 0,5 мл (10 капель); 6-12 лет – 0,5-2 мл (20-40 кап); старше 12 лет – 1 - 2,5 мл (20-50 капель) до 4 раз в сутки. Рекомендованная доза разводится в 0,9% растворе хлорида натрия до общего объема 3-4 мл и ингалируется через небулайзер в течение 6-7 минут
19	Сальбутамол Salbutamol	Аэроз. д/инг. доз. 12 мл, 200 доз (1 доза – 100 мкг)	100 – 200 мкг (1 – 2 дозы) до 4 раз в сутки
20	Флутиказон Fluticasone	Аэроз. д/инг. доз 60 или 120 доз (50, 125 и 250 мкг/доза).	Дети 1-4 лет – 100 мкг 2 р/день, 4 -16 лет – 50-100 мкг 2 р/день, старше 16 лет 100-1000 мкг 2 раза в сутки: при легком течении 100-250 мкг; средней тяжести – 250-500 мкг; тяжелом течении – 500-1000 мкг.
21	Будесонид Budesonide	Сусп. д/инг. доз. 2 мл (0,25 и 0,5 мг/мл).	Детям от 6 мес до 12 лет – 0,25- 0,5 мг 2 раза в сутки, старше 12 лет 0,5 – 1 мг 2 раза в сутки (при необходимости предварительно разбавить

			2 мл 0,9% раствора хлорида натрия). При стенозирующем ларинготрахеите детям от 6 мес - 2 мг/сут в 1-2 приема с интервалом 30 минут.
22	Салметерол/флутиказон Salmeterol/Fluticasone	Аэроз. д/инг. доз. 25 мкг/50 мкг, 25 мкг/125 мкг, 25мкг/250 мкг	Дети с 4 до 12 лет: 2 ингаляции (25 мкг/50 мкг) 2 р/сут, старше 12 лет 2 ингаляции (25+50 или 25+125 или 25+250 мкг) 2 раза в сутки.
23	Будесонид/формотерол Budesonide / Formoterol	Пор. д/инг. доз. 4,5 мкг/ 80 мкг, 4,5 мкг/ 160 мкг	Детям с 6 до 12 лет: 4,5мкг/80мкг/доза – 1-2 дозы 2 р/сут.; 12 лет и старше – 4,5 мкг/80 мкг/доза или 4,5 мкг/160 мкг/доза – 1-2 дозы 2 р/сут
24	Амброксол Ambroxol	Сироп (флак.) 100 мл (15мг/5мл, 30мг/5мл). Раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл, фл. 100 мл (1 мл – 25 капель) Таблетки 30 мг	Детям до 2 лет – 7,5 мг 2 р/сут., от 2 до 6 лет – 7,5 мг 3 р/сут., от 6 до 12 лет – 15 мг 2-3 р/сут., старше 12 лет – 30 мг 3 р/сут во время еды, запивая жидкостью. Ингаляции детям до 6 лет по 2 мл р-ра 1-2 раза в сутки, старше 6 лет и взрослые по 2-3 мл 1-2 раза в сутки, смешивая с физ. р-ром в соотношении 1:1.
25	Ацетилцистеин Acetylcysteine	Гранулы для приг. р-ра для приема внутрь 100мг, 200 мг (пакет) Раствор для приема внутрь 20 мг/мл, фл. 100мл, 200 мл	Детям от 2 до 6 лет 100мг 2-3 р/сут, 6 – 14 лет 100 мг 3 р/сут или 200 мг 2 раз/сут, старше 14 лет – 200 мг 2-3 р/сут.
26	Аммония глицирризинат Ammonium glycyrrhizate	Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 25 мг (пакет) Таблетки 50 мг	Внутрь через 30 минут после еды, растворив содержимое пакета в 1 стол ложке (15 мл) теплой воды (разовая доза); детям 5 мес – 3 лет – 2 раза в сутки, 3-5 лет – 3 раза в сутки, 5-10 лет – 3-4 раза в сутки, старше 10 лет – по 1-2 табл. 2 раза в день
27	Бутамират Butamirate	Сироп 1,5 мг/мл, фл. 50 и 100 мл Раствор для приема внутрь 1,5 мг/мл, фл. 100, 150 и 200 мл	Дети 3-6 лет 7,5 мг 3 раза в день, 6-12 лет – 15 мг 3 раза в день, старше 12 лет – 22,5 мг 3 раза в день. Максимальная суточная

		Табл. покр. обол 20 мг Капли д/пр внутрь 5 мг/мл, фл. 20 мл	доза 90 мг. Детям 2 мес – 1 года – по 10 кап 4 р/сут, 1 год – 3 года – 15 кап 4 р/сут, старше 3 лет – 25 кап 4 р/сут.
28	Леводропропизин Levodropropizine	Сироп 6 мг/мл, фл. 120 мл, 200 мл	Детям от 10 до 20 кг (старше 2 лет) по 3 мл 3 р/сут, 20-30 кг – по 5 мл 3 р/сут, более 30 кг – по 10 мл 3 раза в день
29	Монтелукаст Montelukast	Табл. жеват. 4 мг, 5 мг Табл. покр. обол 10 мг	Дети 2-5 лет табл. 4 мг вечером, 6-14 лет – табл. 5 мг вечером, старше 14 лет – табл. 10 мг.
	Антигистаминные препараты		
30	Цетиризин Cetirizine	Капли для приема внутрь 10мг /1 мл, фл. 10, 20 мл. Табл., покр. обол. 10 мг	Детям 6 – 12 мес – 2,5 мг (5 капель) 1 р/сут, 1-2 года – 2,5 мг 2 р/сут, 2-6 лет – 5 мг (10 капель) в 1-2 приема, старше 6 лет – по 10 мг/сут (20 кап.) в 1-2 приема
31	Лоратадин Loratadine	Сироп (флак.) 100 мл (5 мг/5мл). Табл. 10 мг	Детям от 2 до 12 лет с массой тела менее 30 кг – 5 мг/сут. в 1 прием. Детям с массой тела более 30 кг – по 10 мг 1 раз в сутки.
32	Дезлоратадин Desloratadine	Табл. покр. обол. 5 мг Сироп 0,5 мг/мл, фл. 150 мл Раствор д/приема внутрь 0,5 мг/мл, фл. 60 мл и 120 мл	Детям 6-12 мес – 1 мг (2 мл) 1 р/сут, 1 год – 5лет - 1,25 мг (2,5 мл) 1 р/сут, 6 – 11 лет – 2,5 мг (5 мл) 1 р/сут, старше 12 лет 5 мг (10 мл) 1 раз/сут.
33	Диметинден Dimetindene	Капли д/приема внутрь 1 мг/мл, фл. 20 мл	Детям 1 мес – 12 лет 0,1 мг/кг (2 капли/кг) в сутки в 3 приема; старше 12 лет – 20-40 капель 3 р/сут
	Противовоспалитель- ные препараты		
	Глюкокортикостерои- ды		
34	Преднизолон Prednisolone	Табл. 5 мг Р-р для в/в и в/м введения 30 мг/мл, амп. 1 мл	Начальная доза 0,5-1 мг/кг/сутки в 2-3 приема, поддерживающая 0,3-0,6 мг/кг/сут. Детям 2-12 мес – разовая доза 2-3 мг/кг, 1-14 лет – 1- 2 мг/кг, при шоке 2-5 мг/кг в/в струйно медленно или глубоко в/м.

	Нестероидные противовоспалительные препараты		
35	Ибупрофен Ibuprofen	Сусп. д/приема п/о (флак.) 100 мл (100мг/5мл). Таблетки 200 мг, 400 мг	Разовая доза 5 - 10 мг/кг до 4 р/сут, не более 30 мг/кг/сут с интервалами 6-8 часов
36	Парацетамол Paracetamol	Сусп. д/приема п/о (флак.)100 мл (120мг/5мл; 250 мг/5 мл) Табл. 200 мг, 500 мг Супп. рект. 50 мг, 100 мг, 250 мг, 500 мг	Разовая доза 10-15 мг/кг каждые 4-6 часов, максимально 60 мг/кг/сут. Старше 12 лет 500-1000 мг 4 раза в сутки.
Лекарственные препараты, применяемые в гастроэнтерологии			
37	Дротаверин Drotaverine	Табл. 40 и 80 мг Р-р для в/в и в/м введения 20 мг/мл, амп. 2 мл	Детям до 6 лет назначают по 10-20 мг 1-2 раза в сутки, старше 6 лет – по 20 мг 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза для детей от 6 до 12 лет 80, старше 12 лет – 160 мг. В/м 0,1 – 0,2 мл /год жизни
38	Папаверин Papaverine	Табл. 40 мг Р-р для инъекций 20 мг/мл, амп. 2 мл	Детям с 10 лет 20 мг 3-4 р/сут. Детям с 6 мес до 12лет максимальная разовая доза 0,3 мг/кг, с 12 лет – 20-40 мг, интервал между введениями не менее 4 ч
39	Гиосцина бутилбромид Hyoscine butylbromide	Табл. покр. обол. 10 мг Супп. рект. 10 мг	Детям с 6 лет 1-2 табл. (супп.) 3-5 р/сут, максимально 100 мг/сут
40	Тримебутин Trimebutine	Гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь 25 мг, 100 мг (пакет) Табл. 100 мг, 200 мг	Детям 3-5 лет – по 25 мг 3 р/сут; 5-12 лет – по 50 мг 3 р/сут, с 12 лет – 100-200 мг 3 раза в сутки. Содержимое пакета перемешать в 100 мл воды.
41	Омепразол Omeprazole	Капс. 10 мг, 20 мг	Детям старше 2 лет (масса более 20 кг) 20 мг 1 р/сут или 1 мг/кг/сут, высшая суточная доза 40 мг. Капсулу можно растворить в воде или соке.
42	Эзомепразол Esomeprazole	Пелеты, гранулы д/приг. сусп. д/према внутрь 10 мг	Детям старше 1 года, с массой 10-20 кг – 10 мг 1 р/сут, больше 20 кг 10-20 мг 1 р/сут, старше 12 лет 20-40 мг 1 р/сут.; в составе эрадикационной терапии 2

		Капс. 10 мг, 20 мг, 40 мг Табл. покр. обол. 20 мг, 40 мг	р/сут. Детям старше 12 лет 20-40 мг 1 р/сут
43	Панкреатин Pancreatin	Капс. кишечнораствори- мые 10000 ЕД, 25000 ЕД, 40000 ЕД Табл. кишечнорастворимые покр. обол. 10000 ЕД, 20000 ЕД	Для частичной замести- тельной терапии 300-500 ЕД липазы/кг на 1 прием пищи 3 р/сут. При абсолют- ной панкреатической недостаточности – 1000 ЕД липазы/кг на каждый прием пищи детям до 4 лет, 500 ЕД липазы /кг на прием пищи старше 4 лет; максимально 10000 ЕД липазы/кг. Содержимое капсулы можно перемешать с кислой пищей или жидкостью.
44	Лактулоза Lactulose	Сироп 667 мг/мл, фл. 100 мл, 200 мл, 500 мл	Начальная суточная доза детям до 1 года – 5 мл, 1-6 лет – 5-10 мл, 7 – 14 лет – 15 мл, старше 15 лет – 45 мл.
45	Урсодезоксихолевая кислота Ursodeoxycholic acid	Суспензия д/приема внутри 250 мг/5 мл, фл. 250 мл Капс. 250 мг Табл. покр. обол. 500 мг	Лечение гепатитов 10-15 мг/кг/сут в 2-3 приема; Муковисцидоз – 20-30 мг/кг/сут в 2-3 приема; Дискинезия желчных путей, растворение камней 10 мг/кг/сут в 1-2 приема
46	Сахаромицеты буларди (энтерол) Saccharomyces Boulardii	Пор. д/пригот. сусп. д/приема внутри 250 мг (пакет) Капс. 250 мг	Детям 1 - 3 лет – 1 пакет (капс.) 2 р/сут, старше 3 лет – 1-2 пакета (капс.) 2 р/сут. Содержимое пакета (капс.) можно перемешать с водой, детским питанием.
Лекарственные препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему			
47	Эналаприл Enalapril	Табл. 5 мг, 10 мг, 20 мг	0,08 мг/кг/сут в 1-2 приема, максимально 40 мг/сутки
48	Нифедипин Nifedipine	Табл. 10 мг	0,25-0,5 мг/кг/сут в 3-4 приема, максимально 3 мг/кг/сут (120 мг/сут)
49	Атенолол Atenolol	Табл. 25, 50 и 100 мг	1-2 мг/кг/сут в 1-2 приема, подросткам 25-50 мг/сут в 1-2 приема, максимальная суточная доза 100 мг.
50	Ацетазоламид Acetazolamide	Табл. 250 мг	8-30 мг/кг/сут в 1-4 приема, максимально 70 мг/сут; прием препарата по схеме (5 дней прием,

			2 дня перерыв)
51	Фуросемид Furosemide	Табл. 40 мг Р-р д/ин. (амп.) 1% 2 мл (10 мг/мл)	2 мг/кг/сут в 1-2 приема в первой половине дня, до еды (не более 40 мг/сут). В/в, в/м – 1 мг/кг/сут (не более 20 мг/сут)
52	Дипиридамола Dipiridamole	Табл., покр. обол. 25 мг, 75 мг	2,5 мг/кг 2 раза в день
Препараты железа			
53	Железа гидроксид полимальтозат Ferric (III) hydroxide polymaltosate	Сироп 10 мг/мл (флак. 150 и 75 мл) Капли для приема внутрь 50мг/1мл (флак. 30 мл) Табл. жевательные 100 мг. (100 мг Fe III)	Детям с массой тела менее 15 кг 1-2 капли (2,5-5 мг железа) на 1 кг массы тела; с массой 15-30 кг – 20-40 капель (50-100 мг железа) в сутки для лечения анемии и 10-20 капель – дефицита железа; с массой более 30 кг – 40-120 капель (100-300 мг железа) для лечения анемии и 20-40 капель – дефицита железа. Принимают во время или сразу после еды.
Лекарственные препараты, влияющие на ЦНС			
54	Пирацетам Piracetam	Табл., покр. обол. 400 мг, 800 мг, 1200 мг Капс. 200 мг, 400 мг Раствор для приема внутри 200 мг/мл, флак. 125 мл	Внутри во время еды или натощак 30-50 мг/кг/сут в 2 приема (до 17.00). При интеллектуально- мнестических нарушениях 2,4-4,8 г/сут в 2-3 приема
55	Гопантеновая кислота Gopantenic acid	Раствор д/приема внутри 100 мг/мл, фл. 100 мл, 200 мл Табл. 250 мг, 500 мг	Детям до 1 года 5-10 мл (0,5-1г) в сутки; 1 – 3 года – 5-12,5 мл (0,5-1,25 г) в сутки, 3 – 7 лет – 7,5-15 мл (0,75-1,5 г) в сутки; старше 7 лет – 10-20 мл (1-2 г) в сутки. Внутри через 15-30 минут после еды.
Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях эндокринной системы			
56	Инсулин аспарт Insulin aspart (РинФаст, Фиасп)	Р-р для п/к и в/в введения 100 МЕ/мл (картриджи) 3 мл	Инсулин ультракороткого действия, вводят непосред- ственно перед приемом пищи. Суммарная суточная доза инсулина подбирается под контролем гликемии, ориентировочно 0,5 – 1,0 МЕ/кг/сут., 50-70% от нее обеспечивается инсулином короткого действия.
57	Инсулин детемир Insulin detemir (Левемир)	Р-р для п/к введения 100 МЕ/мл (картриджи) 3 мл	Инсулин длительного действия, вводится 1 раз в сутки. Суммарная суточная доза инсулина

			подбирается под контролем гликемии, ориентировочно 0,5 – 1,0 МЕ/кг/сут. От 30 до 50% суточной дозы обеспечивается инсулином длительного действия.
58	Левотироксин натрия Levothyroxine sodium	Табл. 50 мкг, 75 мкг, 100 мкг, 150 мкг	Врожденный гипотиреоз детям до 6 мес – 10-15 мкг/кг/сут, 6-12 мес – 6-8 мкг/кг/сут, 1-5 лет 5-6 мкг/кг/сут, 6-12 лет – 4-5 мкг/кг/сут, старше 12 лет – 2-3 мкг/кг/сут. Заместительная терапия гипотиреоза 1,6-1,8 мкг/кг в сутки. Суточную дозу принимают утром натощак за 30 минут до еды.
Витамины			
59	Менадиона натрия бисульфит (Витамин К) Menadione sodium bisulfite	Р-р. для в/м введения (амп.) 1и 2 мл (10 мг/1мл) Табл. 15 мг	Новорожденным – в/м 0,1-0,15 мл/кг, до 4 мг/сут. Детям до 1 года – 2-5 мг/сут, 1- 2 лет – 6 мг/сут, 3-4 лет – 8 мг/сут, 5-9 лет- 10 мг/сут, 10-14 лет – 15 мг/сут в 2-3 приема.
60	Колекальциферол (витамин Д) Colecalciferol	Капли для приема внутрь 15 000 МЕ/мл (флак.) 10мл	Здоровому ребенку с 3-4 нед. до 1 года с профилактической целью 1000 МЕ/сут (2 капли), 1-3 лет - 1500 МЕ/сут (3 капли), 3 – 18 лет - 1000 МЕ/сут. Для лечения рахита 1000-5000 МЕ (2-10 капель) в сутки, поддерживающая доза 500-1500 МЕ/сут.